

진코엑스정 80밀리그램 (은행엽엑스)

Ginkgo biloba 80mg

[원료약품 및 분량] 1정 중

은행엽엑스(생구) 80mg

첨가제(타르색소) : 황색 4호 알루미늄레이크, 청색 1호 알루미늄레이크

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

[성상] 노색의 원형 필름코팅정

[효능, 효과] 주효능 효과

1. 말초동맥순환장애(간헐성파행증)의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
3. 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

[용법, 용량]

1. 성인

말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여합니다.
기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여합니다.

2. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 이 약에 과민증 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍症(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 부작용

1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.

2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상 사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 어지러움
- 가려움증

4. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.

5. 입부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

6. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.

7. 저장상의 주의사항

직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정, 500정

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2016.03.11



[제조자]



[제조의뢰판매자]

KOREA PHARMACEUTICAL
INFORMATION CENTER
kepич

KOREA PHARMACEUTICAL
INFORMATION CENTER
kepич